Zampool son pastillas de alta concentración especialmente recomendadas para desinfección en piscinas hinchables.

Composición: Cada pastilla de 5g contiene:

Dicloroisocianurato sódico dihidratado	73 %
Excipientes cps	100 %

INDICACIONES DE PELIGRO: H302 Nocivo en caso de ingestión. H319 Provoca irritación ocular grave. H315 Puede irritar las vías respiratorias. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. EUH031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. EUH206 Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro).
CONSEJOS DE PRUDENCIA: P261 + P271 Evitar respirar el polvo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. P280 + P264 Llevar guantes de protección. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P403 + P233 + P102 + P405 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado y fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P391 Recoger el vertido. P501 Eliminar el contenido y/o de recipiente como residuo peligroso de conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE.

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:
- De irritación a corrosión de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.
- Disfagia, Salorrea y Vómitos (Hematemesis después de grandes ingestiones).
- Edema de glotis, Neumonitis, Broncoespasmo, Edema pulmonar y Neumonía por aspiración.

Medidas básicas de actuación:
- Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel con agua abundante y jabón sin frotar.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito. Si la persona puede tragar saliva, no se produce tos y la ingesta es inferior a una hora, realizar enjuagues bucales con agua.
- Mantenga el paciente en reposo y conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
- En caso de ingestión, no se recomienda vaciado gástrico, valorar la realización de endoscopia.
- Contraindicaciones: Carbón Activado y neutralización con ácidos o bases.
- Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA Teléfono 91 562 04 20.

Fabricado en España por:
ORACHE DESINFECTION S.L.
Calle Secorún nº4
22600 Sabiñánigo (Huesca)
TlF: (+34)974 484 329
Mail: quedesea@orache.es
www.orache.es

ATENCIÓN



PASTILLAS ZAMPOOL

Desinfección en piscinas hinchables



x 32

Desinfección para piscinas hinchables. Uso en el entorno doméstico.

APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS

Uso en el agua del vaso de las piscinas. Bactericida.

Aplicación por el público en general.
- Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta.
- Cumple la Norma UNE_EN1040. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida básica de los antisépticos y desinfectantes químicos (tiempo de contacto: 5 minutos).
- No utilizar en ningún caso en presencia de bañistas.
- Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto (en el caso de piscinas cubiertas, spas, etc).
- La finalidad de este producto es exclusivamente el tratamiento de agua de piscinas, no pudiéndose aplicar fuera de este ámbito.
- El tratamiento químico no se realizará directamente en el vaso. El agua deberá circular por los distintos procesos unitarios de tratamiento antes de pasar al vaso. En situaciones de causa justificada, el tratamiento químico se podría realizar en el propio vaso, siempre, previo cierre del vaso y con ausencia de bañistas en el mismo, garantizando un plazo de seguridad antes de su nueva puesta en funcionamiento.
- No podrá mezclarse con otros productos químicos.
- En su uso por el público en general, el producto no podrá cambiar de envase.
- Incompatible con ácidos, agentes oxidantes y reductores.
- Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua del lavado a la piscina.

Modo de empleo

Utilizar dos pastillas por cada metro cúbico de agua.

1 **NO APLICAR LA PASTILLA DIRECTAMENTE EN LA PISCINA. Disolver previamente en un recipiente con agua y esperar a que la pastilla se diluya.**



2 **Verter a continuación el contenido del recipiente en la piscina.**



Nº de lote y Caducidad: ver tapón.
Nº Registro: 18-60-09375.

32 x 5 g = **160 gr.**

UFI: 8940-60TN-E00W-WCR3

8 436568 580494